

познавательной деятельности, сферы, эмоционально-волевой работоспособности и Выявленные пр. особенности должны учитываться при организации И проведении индивидуальной коррекционноработы ребенком. развивающей Диагностику развития ребенка с ранним детским аутизмом проводит дефектолог.

Комплексная реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра осуществляется в реабилитационных центрах или в отделениях комплексных центров.

Для прохождения комплексной реабилитации необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения с целью признания нуждаемости в социальном обслуживании.

Комплексная (психолого-медикопедагогическая) помощь, оказываемая специалистами реабилитационного центра, включает:

• поведенческую терапию (лечение, которое использует принципы научения для изменения поведения и мышления). Она уменьшает проявления нежелательного поведения (истерики, агрессии и т. д.);

- альтернативную коммуникацию (подбор альтернативных средств коммуникации для неговорящего или малоговорящего ребенка);
- сенсорную интеграцию (взаимодействие всех органов чувств). Она необходима для создания у ребенка образа окружающего пространства, обучения ребенка адекватно реагировать на определенные стимулы и действовать в соответствии с ситуацией.
- обучение социально-бытовым навыкам;
 - музыкотерапию;
 - арт-терапию;
 - логопедическую помощь;
 - лечебную физкультуру;
 - водолечение.

Департамент социального развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Совет директоров государственных учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания»



Диагностика раннего аутизма включает три этапа.

І этап. СКРИНИНГ — выявление отклонений без точной их квалификации. Так как скрининг не используется для установления диагноза, его могут проводить педагоги, врачи-педиатры и родители. Существуют следующие признаки раннего аутизма, наблюдение которых требует дальнейшей углубленной диагностики ребенка.

Признаки аутизма в раннем возрасте:

- отсутствие единичных слов в возрасте 1 года 4 месяцев;
- отсутствие фразы из двух слов в возрасте 2 лет;
- отсутствие невербальной коммуникации (в частности, указательного жеста) в возрасте 1 года;
- потеря речевых или социальных способностей.

Признаки аутизма в дошкольном возрасте:

- отсутствие речи или задержка ее развития;
- особый зрительный контакт: нечастый и короткий либо долгий и неподвижный, редко прямой в глаза, чаще отдаленный;

- трудности в имитации действий;
- выполнение однообразных действий с игрушками, отсутствие творческой игры;
- отсутствие реакции на эмоции других людей, отсутствие изменения поведения;
- необычная реакция на сенсорные раздражители;
- любая озабоченность по поводу социального или речевого развития ребенка, особенно при наличии необычных интересов, стереотипного поведения.

Признаки аутизма в школьном возрасте:

- отсутствие интереса к другим людям, контактов со сверстниками;
- большой интерес к неодушевленным предметам;
- отсутствие потребности в утешении в ситуациях психологической необходимости;
- наличие сложностей с ожиданием в социальных ситуациях;
 - неспособность поддерживать диалог;
 - увлеченность одной темой;
- выполнение видов деятельности, наполненных малой креативностью и фантазией;

- сильная реакция на изменения в привычном ежедневном графике;
- любая озабоченность по поводу социального или речевого развития ребенка, особенно при наличии необычных интересов, стереотипного поведения.

Положительный результат скрининга должен сопровождаться углубленным дифференцированным обследованием.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ этап. ДИАГНОСТИКА – углубленное медикопсихолого-педагогическое обследование ребенка для определения типа нарушения И соответствующего развития образовательного маршрута. Его проводит специалистов: команда психиатр, невролог, психолог, учитель-дефектолог и др. Данный этап включает медицинское обследование. родителей. интервью тестирование, психологическое педагогическое наблюдение. Дифференциальный диагноз устанавливает врач-психиатр.

III этап. ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ:

выявление индивидуальных особенностей ребенка, характеристика его коммуникативных возможностей,

