



ПОСЛЕДСТВИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА

НАСТРОЙКА ОРГАНИЗМА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ



В момент слияния мужской и женской гамет, появляется первая клетка нового организма, с неповторимым ДНК и представляющего собой человеческое существо, развивающееся в теле матери.



С первых минут после оплодотворения организм матери начинает вырабатывать **РФБ (РАННИЙ ФАКТОР БЕРЕМЕННОСТИ)**, с помощью которого вся иммунная система организма подстраивается под вынашивание ребенка, предотвращая отторжение.



Повышается выработка гормона прогестерона, который подготавливает стенку матки для имплантации. **Эстрогены** помогают тканям стать более восприимчивыми к действию **прогестерона**. Вся эндокринная система женского организма готова к выполнению главной задачи — обеспечению безопасности зародившейся жизни.

Основной удар, который получает организм женщины после прерывания беременности на самом раннем сроке — **УДАР по ЭНДОКРИННОЙ и ИММУННОЙ СИСТЕМАМ** организма.

СПРАВКА АССОЦИАЦИИ ЭНДОКРИНОЛОГОВ:

Гормоны критически важны для репродуктивной функции, необходимы для нормальной работы организма, мозга и играют ключевую роль в определении качества жизни. Нарушения в любом звене эндокринной системы могут привести к серьезным заболеваниям.

ДАЖЕ ОДНА ТАБЛЕТКА АБОРТИВНОГО ПРЕПАРАТА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ:

к нарушению функции коры надпочечников | обильным маточным кровотечениям | железодефицитной анемии | гипогликемии (снижению уровня сахара в крови) | депрессивным состояниям | высокому уровню тревоги | снижению защитных сил организма | снижению устойчивости к стрессам | нарушению работы поджелудочной, щитовидной желез, тимуса, яичников, гипофиза.

РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Вопреки ложному мнению, что медикаментозный аборт безопасен, он имеет наиболее частые осложнения: кровотечения ~ 15,6% | неполный аборт ~ 5%, (приводит к необходимости выскабливания полости матки | аллергические реакции и др. осложнения.

«ОТЛОЖЕННЫЕ» ПОСЛЕДСТВИЯ:

гормональный сбой - эндокринный «шторм» приводит к дальнейшим нарушениям в работе всей репродуктивной системы: развитие воспалительных заболеваний органов малого таза | миома, эндометриоз | нарушение обмена веществ, ожирение | высокий риск развития рака молочных желез и женских органов | разные формы бесплодия (по статистике, от 17 до 25% пар в России бесплодны) | тяжелые психологические последствия под общим наименованием «постабортный синдром», которые в дальнейшем негативно влияют на отношения в семье и пр.

СПРАВКА ИНСТИТУТА ПРОФИЛАКТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

Аборт на любом сроке существенно повышает риск возникновения рака молочной железы, останавливая нормальное физиологическое изменение в груди, которое происходит в течение полного срока беременности.

ВНИМАНИЕ!!!

Последствия абортов отрицательно влияют на здоровье рожденных после прерывания беременности детей.

КАК ОСТАНОВИТЬ МЕД АБОРТ?

Для женщин, которые передумали делать аборт уже после приема первой таблетки, есть методика остановки ее действия. Эффективность метода 30-50%.

Метод внесен в Клинические рекомендации Минздрава РФ «Искусственный аборт» от 10.06.24



peredumala.ru

Ни одна беременность

не длится вечно!

Пусть она закончится рождением малыша, который будет надеждой и опорой в вашей жизни.

**НЕ РИСКУЙ
СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ
И ЗДОРОВЬЕМ
БУДУЩИХ ДЕТЕЙ.
СДЕЛАЙ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ!**

8 800 100 48 77

ЛИНИЯ ПОМОЩИ ПРИ КРИЗИСНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

СОХРАНИТЕ ТЕЛЕФОН И ПЕРЕДАЙТЕ
ЕГО НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ



design by
SKRIBUNCVA DESIGN